

CARRICERO COMÚN (*Acrocephalus scirpaceus*)



Joven(Iris 1)



2A(Iris 2)



Ad(Iris 3)



Ad(Iris 4)



Desgaste Ad en Otoño



Nivel de aclaración de las patas con la edad

IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Dorso pardo, con tinte rojizo en el obispillo; partes inferiores blanco ocráceo, con garganta blancuzca; cola pardo uniforme; axilares beige y patas de color pardo claro; con cerdas en la comisura de la boca.

ESPECIES SIMILARES

Similar al **carricero tordal**, que es mucho más grande (longitud 16-20 cm); de igual tamaño son la **buscarla unicolor**, que carece de cerdas en la comisura de la boca; el **zarcero común** con las axilares de color amarillento y el **zarcero pálido**, con las rectrices externas terminadas en una mancha clara.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje. Ala **Ad** (60)62-73[75?], **Joven** (57)59-72(73?). En poblaciones meridionales (especialmente en España) ala más corta en ssp.scirpaceus. En ssp.fuscus, ala mínima =59.(L.Demongin).

EDAD


Pueden reconocerse hasta **3** tipos de edad:

- **Juveniles** con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); **iris gris oscuro**; patas de color gris-azulado; **puntos negros** en la lengua, al menos hasta primeros de octubre.
- **2º año** en algunos ejemplares que tienen el **iris de color pardo-oliva**.
- **Adultos** con plumaje desgastado; **iris gris-marrón cálido** o **marrón rojizo**; patas pardo claro y lengua **sin marcas**.

En primavera, después de la muda **prenupcial** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** parcial que incluye plumas corporales y CPe y CMe alares; a veces también algunas CMA y el par central de plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en los cuarteles de invernada africanos, siendo después indistinguibles por el plumaje. **Estrategia** => **Ad** y **joven**: vp, **IC** [o:] vp, I₁C, i₂p.



Carricero común .Extensión de la muda postnupcial y postjuvenil.