

La migración postnupcial de aves rapaces sobre Ceuta

Texto: Antonio J. Cambelo Jiménez.
Fotos: Joaquín Sánchez Espinosa y Víctor Estrada Devesa.

ABEJERO EUROPEO (*Pernis apivorus*)


Los Abejeros europeos que cruzan hacia Africa por Gibraltar proceden de toda Europa Centro-occidental, Escandinavia y la Península Ibérica.



El área de invernada es África tropical. Una de las características migratorias del Abejero europeo es su mayor capacidad de vuelo frente a otras rapaces planeadoras.

© Joaquín Sánchez Espinosa

MILANO NEGRO (*Milvus migrans*)



La rapaz mas abundante en la migración por el Estrecho, la especie viene registrando un progresivo incremento en el número de efectivos.

Las estimaciones apuntan a que en la década de 1990 el número de individuos de milano negro que cruzaban por el Estrecho de Gibraltar, tras la época de reproducción, era de entre 40.000 y 60.000. Sin embargo, el número ha ido en aumento hasta unos 180.000 después de 2010.

© Joaquín Sánchez Espinosa

AGUILA CALZADA (*Hieraaetus pennatus*)

La migración otoñal transcurre entre principios de agosto y principios de octubre. Según los datos obtenidos por la Fundación Migres se observa una tendencia negativa en el número de ejemplares que migran por el Estrecho, por ejemplo en 2016 cruzaron 43.000 aves, mientras que en 2020 se contabilizaron 24.547.

© Joaquín Sánchez Espinosa

ALIMOCHÉ COMÚN (*Neophron percnocterus*)

El paso postnupcial del Alimoche común, se extiende desde agosto hasta octubre, con máximos a mediados de septiembre. El número de ejemplares que cruzan a África se estima entre 1.300 y 2.500, en solitario o en pequeños grupos que raramente superan las 10 aves, el paso se concentra entre las 9:00 y las 15:00 horas.

© Víctor Estrada Devesa

CULEBRERA EUROPEA (*Circaetus gallicus*)

El Águila culebrera es un migrante transhariano que realiza su paso migratorio postnupcial por Gibraltar desde mediados de septiembre a primeros de octubre, volviendo a España preferentemente entre marzo y abril y existiendo algunos individuos residentes. Realiza su proceso migratorio en solitario o en pequeños grupos que a veces incluye a otros tipos de aves rapaces. Se estima en 10.000 los ejemplares que cruzan el Estrecho.

© Joaquín Sánchez Espinosa

BUITRE LEONADO (*Gyps fulvus*)

Migrante común desde mediados de septiembre a finales de noviembre. Al ser un ave eminentemente planeadora es vulnerable al acoso de las gaviotas, especialmente los ejemplares que durante el trayecto sobre el mar han perdido altura y llegan a la costa batiendo alas

Son principalmente aves jóvenes las que suelen caer al mar, debido a su inexperiencia. En la foto un ave inmadura.

© Joaquín Sánchez Espinosa

GAVILÁN COMÚN (*Accipiter nisus*)

Más abundante en el paso prenupcial, se detectan menos aves sobre Ceuta durante el paso postnupcial quizá debido a su menor dependencia a las buenas condiciones climáticas para cruzar el Estrecho. Menos dependiente que otras rapaces de las corrientes de aire térmicas y los vientos predominantes durante el cruce.



© Victor Estrada Devesa

CERNÍCALO VULGAR (*Falco tinnunculus*)

Los Cernícalos vulgares que cruzan por Gibraltar pueden provenir tanto del norte de Europa como de Europa central y de la península Ibérica. Los machos son más fieles a sus territorios permaneciendo todo el año, mientras que parte de las hembras realizan movimientos dispersivos después de la época de cría.

© Victor Estrada Devesa