

NUEVOS DATOS SOBRE LA NIDIFICACIÓN DEL CHAGRA (*Tchagra senegal*) EN CEUTA

*Autor: Antonio José Cambelo Jiménez
Editor de la revista y miembro del Grupo de Anillamiento Chagra*

Son relativamente recientes los datos que tenemos sobre una extraordinaria especie exclusivamente distribuida en el continente africano, rasgo que junto con otras pocas especies y subespecies mas, diferencia y a la vez enriquece la avifauna Ceutí y Española.

Efectivamente el Chagra, ave de conducta discreta y misteriosa a pasado desapercibida en nuestros montes hasta la decada de los noventa. Fue entonces cuando a cuentagotas se han efectuado las observaciones que nos han demostrado que aunque escasa y difícil de observar podemos considerarla como una de las especies de la fauna alada de nuestra Ciudad.



En la fenología de las observaciones (ver fig.1) se apuntaban ya indicios de su posible reproducción (*José Jiménez Martínez y José Navarrete Perez en su obra "Estatus y Fenología de las Aves de Ceuta" lo califican como residente raro y constantan la ausencia de datos sobre su reproducción*). No obstante, ha sido este año cuando por fin podemos asegurar que la especie se reproduce en la zona de Calamocarro, lugar donde se tienen la mayoría de anillamientos y observaciones. El pasado día 1 de Mayo, en la estación

de anillamiento de Punta Blanca, se capturó para el anillamiento un ejemplar de Chagra que tras ser examinado se comprobó que tenía una placa incubatriz en desarrollo (ver fotografía en página siguiente)




En la imagen, podemos ver claramente la placa incubatriz en una primera fase, lo que parece indicar que todavía no se había producido la puesta.



▲ En la imagen superior placa incubatriz en desarrollo.
 ◀ A la izquierda vista dorsal del ave, en la que se aprecia las alas cortas y la larga cola característica del Chagra.

FENOLOGÍA DE LAS OBSERVACIONES DEL CHAGRA (1995-2003)



© Grupo CHAGRA

Figura 1