

El Alcaudón Común en la ciudad de Ceuta (1998-2014)

Texto y foto: José Navarrete Pérez

El Alcaudón Común (*Lanius senator*) es un pájaro de tamaño mediano que habita en espacios abiertos con árboles, arbustos o grandes matorrales. Se alimenta de pequeños invertebrados, así como de pequeñas aves, ratones, lagartijas... siendo considerado como una “pequeña rapaz”. Suele empalar a sus presas en espinos. Es fácil de localizar en tendidos eléctricos, cercados o en lo alto de arbustos o matas que utiliza como atalayas de caza.




La zona de reproducción se distribuye en torno al Mediterráneo y es invernante transahariano.


En Ceuta es conocido popularmente como “alcudón” (de ahí el nombre de esta revista). Presenta una gran diferencia de efectivos entre la migración prenupcial en la que es común, y la postnupcial en la que es raro. Esta peculiaridad también se observa en otras especies transaharianas, como la Tórtola Común, la Codorniz común o la Abubilla.

Entre 1998 y 2014 (a.i.) por parte del grupo de anillamiento CHAGRA se ha procedido al marcaje de 219 ejemplares, capturados para este fin en las estaciones de anillamiento de Ceuta ubicadas en Punta Blanca (hábitat: cañaveral y arbustos varios dispersos), Arroyo de Calamocarro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado) y Monte Hacho (matorral y arbustos). Para más información véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta”, publicado en el nº 9 de esta revista, año 2011.

Se observa una preferencia por la zona del Arroyo del Infierno, seguido de Punta Blanca, a continuación el Monte Hacho y por último el arroyo de Calamocarro (gráfico nº 1).



En el gráfico n° 2 se representa la media de capturas mensuales (repartidas en 3 decenas por mes) para el conjunto de las cuatro estaciones de anillamiento. La migración prenupcial la realiza desde primeros de marzo hasta finales de mayo, con máximos en la segunda decena de abril. Hay dos observaciones de fechas muy tempranas: el 4 de enero de 2004 y el 4 de febrero de 1997.



El periodo de sedimentación parece corto, a tenor de los dos únicos autocontroles obtenidos en este sentido (3 y 7 días).


Una hembra anillada el 02/05/2004 fue recuperada el 06/05/2005, ambas ocasiones en Punta Blanca y en periodo de migración, con una diferencia de un año.

Sólo conocemos una recuperación de fuera de Ceuta, un macho anillado en Casas Viejas (Cádiz) el 22/06/1967 se recupera en Ceuta el 26/03/1968 (278 días, 68 km.)(Oficina de Especies Migratorias).

Durante la migración postnupcial ya se ha comentado que es raro, desde 1985 sólo se han capturado dos aves para anillamiento y se dispone de 16 observaciones para este periodo (véanse los “noticiarios ornitológicos” de esta revista “Alcudón”), para un total de 7 adultos y 13 jóvenes. Las citas se reparten entre los meses de agosto y septiembre, a excepción de una más temprana (28 de julio de 2013) y otra más tardía (30 de octubre de 2008).

El Alcaudón común hasta hace unos años era objeto de caza con cepos, siendo la “pieza” más preciada por este tipo de furtivismo. Aunque esta práctica afortunadamente está casi erradicada, en Ceuta aún se dan algunos casos ocasionales y con más habitualidad en Marruecos.

En el gráfico nº 3 se representa la evolución de capturas anuales en migración prenupcial, en el mismo se observan grandes altibajos, con máximos en los años 2002, 2004 y 2009 y mínimos en 2003 y 2008.



Visita nuestra nueva web Aves de Ceuta
www.seoceuta.es