



Durante el año 2016 el grupo de anillamiento CHAGRA ha procedido al anillamiento de 3.350 aves pertenecientes de 65 especies diferentes. Las estaciones de anillamiento han sido las tradicionales: Punta Blanca (cañaveral y arbustos), Arroyo de Calamocarro (bosque mediterráneo), Arroyo del Infierno (bosque y matorral, bastante degradado) y Monte Hacho (matorral y arbustos) (para más información véase el artículo “Estaciones de Anillamiento de Ceuta” en el n° 9 de esta revista).

La estación del arroyo de Calamocarro está integrada en el programa PASER (Programa de anillamiento y Seguimiento de Especies Reproductoras) y el programa PASEMs (Programa de Anillamiento y Seguimiento de Especies Migradoras-Posnupcial), la estación del arroyo del Infierno está integrada en el programa PASEMn (Programa de Anillamiento y Seguimiento de Especies Migradoras-Prenupcial).

Los resultados de especies anilladas por estaciones se indican en la tabla n° 1

Nombre/Especie	Punta Blanca	Arroyo Calamocarro	Arroyo del Infierno	Monte Hacho	P. L. Michahellis	P. L. audouinii	P. F. tinnunculus	Otros	Total general
<i>Abubilla (Upupa epops)</i>	6		1						7
<i>Agateador común (C. brachydactyla)</i>		2							2
<i>Alcaudón común (L. senator)</i>	11		35						46
<i>Bisbita arbóreo (A. trivialis)</i>	1			1					2
<i>Bisbita pratense (A. pratensis)</i>	1		1						2
<i>Bisbita de Hogdson (Ph. hogsoni)</i>			1						1
<i>Buitrón (Cisticola juncidis)</i>			6						6
<i>Bulbul naranjero (Pyc. barbatus)</i>	6	1	5	5					17
<i>Buscarla pintoja (Locustella naevia)</i>			1	1					2

<i>Carbonero común (Parus major)</i>	12	15	1	9	37
<i>Carricero común (Acro. scirpaceus)</i>	1	6	119	1	127
<i>Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)</i>				29	29
<i>Chochín (Troglodytes troglodytes)</i>	1	6	2	2	11
<i>Chotacabras cuellirojo (Cap. ruficollis)</i>					1 1
<i>Chotacabras europeo (Cap. europaeus)</i>					1 1
<i>Codorniz (Coturnix coturnix)</i>					1 1
<i>Colirrojo real (Ph. phoenicurus)</i>	1	2	13	2	18
<i>Colirrojo tizón (Ph. ochruros)</i>	3		5	22	30
<i>Curruca cabecinegra (S. melanocephala)</i>	22	71	33	22	148
<i>Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)</i>	111	32	121	124	388
<i>Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)</i>	9		10	3	22
<i>Curruca mirlona (Sylvia hortensis)</i>	1		3	2	6
<i>Curruca mosquitera (Sylvia borin)</i>	30	1	82	23	136
<i>Curruca rabilarga (Sylvia undata)</i>				2	2
<i>Curruca zarcera (Sylvia communis)</i>	7	1	22	2	32
<i>Escribano montesino (Emberiza cia)</i>		1			1
<i>Escribano sahariano (Emberiza sahari)</i>					1 1
<i>Escribano soteño (Emberiza cirrus)</i>	8	2	1		11
<i>Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)</i>					1 1
<i>Garza real (Ardea cinerea)</i>					1 1
<i>Gaviota de Audouin (Larus audouinii)</i>				36	36
<i>Gaviota patiamarilla (L. michahellis)</i>				132	132
<i>Golondrina común (Hirundo rustica)</i>			16		16
<i>Gorrión común (Passer domesticus)</i>	109		31	27	167
<i>Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)</i>	21				21
<i>Herrerillo africano (Parus teneriffae)</i>	6	32	5	8	51
<i>Jilguero (Carduelis carduelis)</i>	228		1	30	259
<i>Lúgano (Carduelis spinus)</i>	6			1	7
<i>Mirlo común (Turdus merula)</i>	9	17	4	5	35
<i>Mosquitero comun (Ph. collybita)</i>	35	5	43	46	129
<i>Mosquitero ibérico (Ph. ibericus)</i>	2		4	1	7
<i>Mosquitero musical (Ph. trochilus)</i>	28		23	49	100
<i>Mosquitero papialbo (Ph. bonelli)</i>	2		9	16	27
<i>Papamosas gris (Muscicapa striata)</i>	1	5	15		21
<i>Papamoscas cerrojillo (Fic. hypoleuca)</i>		1	4	17	22
<i>Pardela cenicienta (Cal. diomedea)</i>					3 3

<i>Pardillo común (Carduelis cannabina)</i>	23		2	60					85
<i>Perdiz moruna (Alectoris barbara)</i>								1	1
<i>Petirrojo (Erithacus rubecula)</i>	46	83	14	133					276
<i>Pinzón vulgar (F. c. coelebs)</i>	4								4
<i>Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)</i>	1								1
<i>Pinzón vulgar (F. c. africana)</i>	12	25	3	18					58
<i>Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)</i>			2						2
<i>Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)</i>				1					1
<i>Ruiseñor común (L. megarhynchos)</i>	7	1	15	4					27
<i>Tarabilla común (Saxicola torquata)</i>	1	1		1					3
<i>Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)</i>	1			1					2
<i>Tórtola europea (Streptopelia turtur)</i>								1	1
<i>Triguero (Miliaria calandra)</i>				1					1
<i>Vencejo común (Apus apus)</i>								3	3
<i>Vencejo pálido (Apus pallidus)</i>								12	12
<i>Verdecillo (Serinus serinus)</i>	247	84	27	37					395
<i>Verderón (Carduelis chloris)</i>	185	14	4	15					218
<i>Zarcero bereber (Iduna opaca)</i>	3			4					7
<i>Zarcero común (Hippolais polyglotta)</i>	11	13	62	23				1	110
<i>Zarcero pálido (Hippolais pallida)</i>				1					1
<i>Zorzal común (Turdus philomelos)</i>				3	17				20
TOTAL GENERAL	1219	423	754	730	132	36	29	27	3350

Tabla n° 1.- Resumen de aves anilladas por el grupo CHAGRA durante 2016

Asimismo se han realizado 380 recapturas pertenecientes a 26 especies, de las cuales 289 proceden del propio grupo CHAGRA, 86 de otros anilladores nacionales, 4 de Bélgica, 1 de Holanda y 1 de Alemania. El resumen de las recapturas propias se indica en la tabla n° 2.

Los autocontroles más importantes se indican a continuación, donde (A) son los datos de anillamiento y (R) los datos de recaptura:

Autocontroles mas importantes

Los autocontroles más importantes se indican a continuación, donde (A) son los datos de anillamiento y (R) los datos de recaptura: