


MAYO – JUNIO DE 2006



*En un improvisado comedero, el pasado 29 de Mayo de 2006, se llegaron a contabilizar unos 250 ejemplares de Buitre leonado (*Gyps fulvus*) que permanecían desde hacía varios días en territorio ceutí, a la espera de mejores condiciones meteorológicas para cruzar el Estrecho de Gibraltar.*

ESPECTACULAR PASO DE BUITRES EN CEUTA

Durante la última quincena del mes de Mayo del pasado año se dieron en Ceuta unas malas condiciones climatológicas con fuertes vientos de levante y escasa visibilidad, lo que obligó a las aves migrantes especialmente a las planeadoras a sedimentarse y permanecer esperando las óptimas condiciones para realizar el cruce del Estrecho de Gibraltar. Este fenómeno fue especialmente llamativo y espectacular en el caso del Buitre leonado (*Gyps fulvus*) de los que se llegaron a contabilizar en los momentos álgidos hasta 250 ejemplares.



Autor: Antonio Jose Cambelo Jiménez

Las desfavorables condiciones meteorológicas con cielos cubiertos y fuertes vientos de levante, obligaban a desplazarse a los buitres sin poder utilizar "las térmicas" con lo que muchos ejemplares se encontraban bastante extenuados, debido a esta situación y la imposibilidad de que las aves encontraran alimento en el territorio de Ceuta, los buitres empezaron a dejarse ver muy próximos y confiados, llegando a introducirse algunos ejemplares en perreras disputándoles los despojos de carne a los perros. Algunos ciudadanos espontáneamente empezaron a alimentar a las aves creándose en algunos lugares improvisados comederos.

El 27 de Mayo de 2006 a las 19:20 horas (horario oficial), observando uno de estos grupos de aves que acudían a los despojos que se les arrojaban, me llama la atención uno de los buitres llamativamente diferente, su aspecto general era el de un buitre marrón chocolate oscuro, ligeramente



A.J. Cambelo

mas pequeño y mas grácil que los Buitres leonados que están próximos a él. Al aproximarme más puedo apreciar que las supracobertoras alares (pequeñas, medianas y grandes), cobertoras de las primarias y plumas de la espalda tienen unas llamativas manchas en las puntas conspicuamente mas claras de un tono beige. Esta característica le daba al ave un aspecto escamoso y muy diferente al de los Buitres leonados próximos. En lo que respecta a las partes inferiores, solo pude apreciar que eran también más oscuras que las de los leonados. El tiempo de observación fue desde las 19:20 hasta las 20:00 horas. En su comportamiento puede comprobar que el ave era mas confiada que los otros buitres permaneciendo a menudo en la periferia del grupo y mas próximo al observador.

El 29 de Mayo, en una concentración de aproximadamente 250 Buitres leonados (*Gyps fulvus*), de los que 190 se encontraban posados en el suelo, se detectan dos ejemplares inmaduros de Buitre moteado. El tiempo de observación fue de 14:00 a 14:30 horas (hora oficial). Y pudieron

ser observados a muy corta distancia (3-4 mts.) al ser de carácter mas confiado que los leonados. Durante este día es observada y fotografiada esta concentración en el Monte Hacho.



A.J. Cambelo

29 de Mayo de 2006

El 30 de Mayo, en el Monte Hacho, es fotografiada esta concentración de aves y en especial Roger Jacquemai, obtiene varias imagenes de un ejemplar inmaduro en vuelo sobre la Playa del Desnarigado.

Por último, el día 17 de Junio de 2006, en un grupo de menor tamaño de Buitres



J.M. Beltran

17 de Junio de 2006



A.J. Cambelo

leonados (*Gyps fulvus*) se observan un total de cinco ejemplares de Buitre moteado (dos inmaduros y tres jóvenes), en ambas edades se puede apreciar claramente las plumas de las partes inferiores del cuerpo de un color mucho mas oscuro que el leonado, con la parte central del eje de la pluma más claro (en el caso de los inmaduros).



J.M. Beltran

17 046

En cuanto a los jóvenes, presentaban un color chocolate oscuro uniforme y el plumón de la cabeza y cuello de un color grisáceo. Fueron observados como en las anteriores observaciones desde corta distancia (unos 5 mts.) y el horario desde las 11:50 a las 12:05 horas (hora oficial).



Roger Jacquemaí

◀ Buitre moteado inmaduro, fotografiado el 30 de Mayo de 2006, en el Monte Hacho. En la imagen podemos apreciar, la conspicua banda blanca en el borde inferior de ataque del ala, contrastando con el marrón chocolate oscuro de las plumas de las partes inferiores.

► El mismo ejemplar de la foto superior, esta vez mostrando el diseño de la parte superior del plumaje. Se puede apreciar el color oscuro y el llamativo aspecto escamoso de las cobertoras alares, escapulares y supracobertoras caudales. Otra diferencia es el perfil más redondeado que presentan las puntas de las primarias internas y secundarias, lo que le da al ala un aspecto mas redondeado, siendo en el Buitre leonado mas rectangular.



Roger Jacquemaí



▲ En esta foto, podemos observar claramente la diferencia entre un ejemplar inmaduro de Buitre moteado (*Gyps rueppelli*) y otro inmaduro de Buitre leonado (*Gyps fulvus*) a la derecha.

► Una vez alcanzado el plumaje de adulto, el Buitre moteado, es inconfundible no siendo posible su confusión con nuestras especies de buitres autoctonos.



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Guía de Aves del Estrecho de Gibraltar. David Barros Cardona y David Rios Esteban. Orni Tour S.L.

Guía de Identificación Aves de Europa Norte de África y Próximo Oriente. Mark Bekman y Steve Madge. Ediciones Omega. También fotos obtenidas por Internet.



▲En las dos fotos superiores, Buitre moteado inmaduro, fotografiado el 29 de Mayo de 2006, junto a un elevado número de ejemplares de Buitre leonado, en las proximidades del Fuerte de San Francisco de Asís.▼ Detalle de la concentración de aves el mismo día en un improvisado comedero.

