


ORIGEN Y MOVIMIENTOS DE LAS CURRUCAS CAPIROTADAS (*Sylvia atricapilla*) EN MIGRACIÓN POR CEUTA, EN BASE A LAS RECUPERACIONES

Autor: Antonio José Cambelo Jimenez

INTRODUCCIÓN


En este numero vamos a revisar en base a los datos aportados por las recuperaciones de aves anilladas, el origen de la población de las Currucas capirotadas migrantes por el territorio ceutí.



© J. M. Varela

En total son 7 las recuperaciones que disponemos, repartiéndose de la siguiente forma: 3 en Gran Bretaña (42,85%), 2 en la Península Iberica (28,57%), 1 en Holanda (14,28%) y 1 en Belgica (14,28%). Las recuperaciones en territorio europeo suponen un 71,42%.

RECUPERACIONES DE CURRUCA CAPIROTADA (*Sylvia atricapilla*) POR PAISES




ANALISIS DE LOS DATOS

A la vista de las recuperaciones disponibles, llama poderosamente la atención la alta proporción de recuperaciones de aves originarias de Europa (71,42%) en contraposición con solamente el 28,57% en la Península Iberica. Estos datos nos llevan a la conclusión que los ejemplares de Curruca capirotada que pasan por el territorio ceutí son mayoritariamente de origen europeo. Concretamente, dentro del contingente de estas aves europeas, tiene especial importancia las aves

originarias de Gran Bretaña con un 60% del total y si afinamos mas, un dato mas que llama la atención es lo proximas que se encuentran las localidades de origen de las aves inglesas, en el Suroeste de la isla. Las otras dos recuperaciones europeas proceden de los Países Bajos (Belgica y Holanda).

Si observamos de manera mas general las recuperaciones europeas, vemos que estas no dejan de presentar una cierta agrupación, que (a falta de completarse con mas datos en un futuro) nos dibujan que el área geografica de la que son originarias nuestras Currucas de paso es el sur de Gran Bretaña y las llanuras costeras atlánticas de los países del Occidente Europeo. La distancia media de los desplazamientos de estas aves es de 1.786,4 Kms.



Zona geografica propuesta como origen de la población de Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) migrante por la Ciudad de Ceuta. El circulo rojo marca la zona de origen de las Currucas Británicas.

Por otro lado, al mayoritario flujo de migrantes europeos, tambien se une en menor cantidad una parte de la población ibérica (posiblemente del Sureste peninsular).

BIBLIOGRAFIA

JIMENEZ MARTÍNEZ, J. y NAVARRETE PÉREZ, J. *Estatus y Fenología de las aves de Ceuta*. Instituto de Estudios Ceutíes. 2001.