

Citas publicadas en el Noticiero Ornitológico de la Revista Ardeola nº 53 (2):

Busardo Moro (*Buteo rufinus*) Después del primer registro de nidificación en Ceuta, en la ZEPA de Benzú-Calamocarro (véase Ardeola, 51:548) se vuelve a comprobar la cría con éxito en la temporada 2005 y 2006 sacando adelante un pollo en cada una (A. Ávila).

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*) Una pareja con cuatro pollos en el arroyo del Infierno, Ceuta, durante la temporada de cría de 2004 que corresponden a los primeros datos de nidificación de la especie (J. Navarrete, M.V. Rodríguez Ríos, J. Peña y M.A. Guirado); durante la temporada de cría de 2006 se vuelve a detectar una pareja con un solo pollo en el mismo lugar (J. Navarrete y A. Parrado).

Roquero Rojo (*Monticola solitarius*) Primera cita para la especie en Ceuta, se observa un macho en Punta Blanca, el 23 de abril de 2005 (J. Peña).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*) Primera cita para la especie en Ceuta: un juvenil en el Monte Hacho, el 16 de octubre de 2005 (M.V. Rodríguez Ríos, J. Peña, J.M. Aguirre, A. Parrado y J. Navarrete).

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*) En Ceuta, donde no se había constatado la reproducción, se han capturado para anillamiento algunos adultos y jóvenes en el arroyo de Calamocarro desde el año 2001 al 2006 (J. Navarrete y J. Peña).

Chova Piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) Alrededor de 40 aves en el repetidor de Isabel II, Ceuta, el 21 de mayo de 2006 mezcladas con grajillas. Sólo había una cita anterior de 20 aves en e año 1996 (M.A. Guirado).

Cita Publicada en “últimas noticias sobre avifauna” de la Revista La Garcilla nº 129:

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*) Primera observación en Ceuta de un ejemplar los días 7 y 8 de marzo de 2006 (J. Peña); la especie se considera accidental en el norte de África, con sólo un par de observaciones conocidas para Marruecos.