

MUDA COMPLETA EN LA CURRUCA CABECINEGRA (*SYLVIA MELANOCEPHALA*) CON RETENCIÓN DE PLUMA

Autor: Jose Navarrete Pérez.

El día 20 de octubre de 2007 se capturó para anillamiento, en Ceuta, una Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*), que había reemplazado todas las plumas del cuerpo, rectrices y plumas de vuelo, exceptuando la 3ª primaria del ala derecha, la cual quedaba retenida, sin mudar.

Existen pequeñas proporciones de aves jóvenes de algunas especies que pueden realizar mudas parciales extensas, y que incluso pueden llegar a ser una muda completa. Estos casos son mas cuantiosos cuanto mas al sur nos encontremos (Jenni & Winkler 1994, Gargallo & Clarabuch 1995), concretamente en *Sylvia melanocephala* se pudo comprobar en Ceuta (Navarrete & Jiménez 1997).

Por lo tanto, y atendiéndonos a la muda observada en este ejemplar nos puede llevar a pensar que se trata de un joven con muda parcial “muy extensa”, “casi” completa, y datarlo con código EURING 3.

Este ave portaba la anilla N-149509, tratándose por tanto de una recuperación.



Autor: José Navarrete Pérez

Consultada la base de datos se comprobó que se trata de un ave anillada el día 6 de abril de 2005, con edad EURING 5, por lo que se encontraba consecuentemente en su 4º año calendario.

Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre si las las mudas

completas en aves adultas siempre llegan a serlas o si, por el contrario, puede retener, por el motivo que sea, alguna pluma.

Bibliografía

Jenni L. & Winkler R. (1994). *Moult and ageing of european passerines.* Academia Press, London.

Gargallo G. & Clarabuch O. (1995). *Extensive Moult and ageing in six species of passerines.* Ringing & Migration 16, 178-189).

Navarrete J. & Jiménez J. (1997). *Estudio de muda en paseriformes norteafricanos.* Apus nº 10, 7-11.