

## Otras revistas

Revista Ardeola n° 65 (1), del año 2018.  
Sección “Observaciones de Aves raras en España”:

**CHARRÁN REAL** (*Sterna máxima*) Ceuta, tres ejemplares (dos adultos y uno de primer año), fotos, 25 de octubre (Miguel Á. Guirado).

**PITO REAL BEREBER** (*Picus vaillantii*) Ceuta, una hembra, fotos, 11 de septiembre (Joaquín Sánchez –comunicado por José Navarrete).

(Norte de África). El pito real bereber fue una especie común en la provincia marroquí de Tetuán a finales del siglo XIX y durante la primera parte del siglo XX, pero ya en 1979 se consideraba escaso (El Khamlichi, R. y Sarrión, J. A., 2015), sin existir constancia de su presencia en la zona desde entonces hasta 1990, año en el que, al parecer, fue observado en Ceuta (según referencias sin homologar, –Jiménez, J. y Navarrete, J., 2001–). A esta le siguieron otras dos posibles observaciones en la ciudad, en 1999 y 2001 (según las mismas referencias, sin homologar). Años más tarde, en mayo de 2015, El Khamlichi, R. y Sarrión, J. A. (2015) localizaron un nido al sur del Jbel Moussa, unos 5 km al oeste de la frontera con Ceuta. Cuatro meses después se produjo la presente observación de una hembra dentro del territorio ceutí, que además pudo ser fotografiada y remitida al CR. Esta constituye la primera de la que se tiene constancia probada hasta el momento en España.

**BISBITA DE HODGSON** (*Anthus hodgsoni*) Ceuta, un ejemplar adulto, fotos, 15 de marzo (Manuel V. Rodríguez); capturado para anillamiento.

**ESCRIBANO SAHARIANO** (*Emberiza sahari*) Ceuta, un macho de primer año, fotos, del 9 al 14 de noviembre (José M. Moreno, José Jiménez); capturado para anillamiento.

(Norte de África). Aunque inverna en zonas próximas a Ceuta, nunca antes se habían homologado citas de esta especie en la ciudad autónoma. Este registro supone además el quinto para el conjunto de España. Según Amezian et al., 2006, el escribano sahariano experimenta un proceso de expansión hacia el norte de Marruecos que le ha llevado a colonizar nuevos territorios en las últimas décadas. Esto podría explicar también la aparición de ejemplares en la Península, en donde tres de los cuatro registrados se detectaron en los

últimos ocho años, pero el escaso número de muestra y las dudas sobre el origen de estas aves que se han planteado en alguna ocasión, impiden extraer conclusiones definitivas al respecto. Sin embargo, la cita de Ceuta, de un macho joven capturado en noviembre, cuando parte de la población realiza movimientos hacia zonas de menor elevación, encaja perfectamente en el contexto mencionado de expansión de la especie.

Revista Ardeola nº 65 (1), del año 2018.

Sección “Noticario Ornitológico”:

**BUITRE MOTEADO** (*Gyps rueppellii*) En Ceuta, año 2016: dos ejemplares en el Arroyo de las Bombas el 13 y el 28 de mayo (J. Sánchez Espinosa) y dos aves en el Monte Renegado el 24 de junio (J. L. Ruiz García).

**HALCÓN DE ELEONORA** (*Falco eleonorae*) En Ceuta, en 2016, cuatro observaciones: tres aves el 1 de agosto, tres el 16 de agosto, una el 18 de agosto y un ave el 5 de noviembre (SEO-Ceuta).

**GAVIOTA DE AUDOUIN** (*Larus audouinii*) En 2014 se confirmó por primera vez la reproducción en el puerto de Ceuta, en 2017 se anillaron con PVC 36 pollitos en esta colonia (SEO-Ceuta).

**CHARRÁN BENGALÍ** (*Sterna bengalensis*) En Ceuta, 13 observaciones entre el 19 de junio y el 9 de noviembre: una en junio (dos aves), siete en septiembre (146 aves, máximo 70 el día 24), cuatro en octubre (22 ejemplares) y una en noviembre (cuatro aves/SEO-Ceuta).

**CORNEJA PÍA** (*Corvus albus*) Continúa un ejemplar en la ciudad autónoma de Ceuta, con citas entre el 30 de marzo y el 19 de diciembre de 2016, aunque el 21 de noviembre se vieron dos aves (SEO-Ceuta).

Revista Aves y Naturaleza nº 26, año 2018.

Sección “La mirada local”:

Entrevista al ex coordinador de grupo sobre acciones y actividades realizadas por el grupo local de Ceuta.

Revista Aves y Naturaleza nº 27, año 2018.

Artículo: Medidas de protección para la gaviota de Audouin en Ceuta.